

CULIER

(export du DFSM au 30/05/2026 à 10:26)

[1] CULIER (boyau culier) Médecine - Anatomie

adj.

Étymologie FEW II-2 1509a : culus

Définition Dernier boyau du système digestif, considéré comme rectiligne, qui se termine par l'anus.

Notes

- var BOUEL CULIER var BOUIAU CULLIER var LONGAON var CUL
- Note encyclopédique

En f. mod., rectum. Ce dernier mot est attesté depuis les traductions de Guy de Chauliac, d'après TLF. [I. Vedrenne-Fajolles]

Citations

- L'unziesme de l'anathomie des membres generatis de peridoneon (c'est le bouel culier) et du cul.
Anon. [Henri de Mondeville], *Chirurgie, 1314, chap. 29, p. 16.*
- Anus est le trou du cul, ou quel est determinee la partie dehors et desous du longaon, (c'est du bouel culier) par le quel les feces et les estrons sont mis hors du cors humain.
Anon. [Henri de Mondeville], *Chirurgie, 1314, chap. 517, p. 128.*
- [...] et le cul, en médecine, est pris en II manieres ; en une maniere, pour le droit bouiau cuillier , qui est le derrenier, et est autrement appelé longaon ; et le cul est pris, en medecine, aucunefoiz, pour cel bouiau ; autrement, le cul est pris pour l'extremité de bas de ce bouiau, et ainsi le prent tout le commun, pour le bout et extremité qui appert dehors.
Martin de Saint-Gilles, *Comment. Aphorismes Ypocras, 1363, p. 137.*